

Hyacinten als snijbloem



De bollen ondergaan, afhankelijk van het gewenste bloeitijdstip en de cultivar, gedurende 10 tot 15 weken een koudebehandeling bij 9 graden Celsius. De behandeling wordt uitsluitend gegeven aan bollen die in kisten zijn geplant en in de bewortelingsruimte of kuil bij de bloementeler staan. Bij het oogsten moet een deel van de bolschijf aan de stengel blijven zitten, anders bloeit de hyacint niet uit. Na deze koudebehandeling worden de kisten vanuit de bewortelingsruimte of kuil in de kas geplaatst. Afhankelijk van de kastemperatuur (18 tot 20 graden Celsius) zijn de bloemen na 2 tot 3 weken oogstbaar. Afhankelijk van de preparatie en de cultivar is vanaf half december tot april bloei mogelijk.

Hyacinten op pot



De bollen ondergaan, afhankelijk van het gewenste bloeitijdstip en de cultivar, gedurende 8 tot 12 weken een koudebehandeling bij 9 graden Celsius. Deze handeling wordt uitsluitend gegeven aan bollen die op potten zijn geplant en in de bewortelingsruimte bij de bloementeler staan. Na deze behandeling worden de potten vanuit de bewortelingsruimte in de kas geplaatst. Afhankelijk van de kastemperatuur (18 tot 25 graden Celsius) zijn de potten na 1 tot 2 weken verkoopbaar. Afhankelijk van de preparatie en de cultivar zijn de potten vanaf december tot april leverbaar.